

新冠病毒疫苗接种知识问答

1. 新冠疫苗有必要接种吗？

虽然目前国内新冠病毒肺炎疫情已经得到良好控制，但境外输入风险仍较高，对于新冠病毒，所有人都缺乏免疫力，所有人都是易感者。疫苗是预防传染病最有力的武器，人群中疫苗接种率达到一定程度，可形成有效群体免疫屏障，阻断新冠肺炎传播蔓延。因此，在没有接种禁忌症的情况下，符合条件的人群均推荐接种新冠病毒疫苗。

2. 新冠疫苗是否安全有效？

新冠病毒疫苗和其他疫苗一样，质量安全管理有一系列的保障措施。在疫苗的生产制造过程中，国家药品监管部门对企业的生产、制造标准都有明确要求，疫苗在获得注册前必须经过严格的动物实验和临床研究，并在疫苗上市使用前实施严格的批签发制度。所以，获得国家批准，上市的疫苗都是安全性、有效性达到合格标准的。

3. 如何进行疫苗接种呢？

新冠病毒疫苗规格为 0.5ml/支，每次接种剂量为 0.5ml，上臂三角肌肌肉内注射。新冠病毒灭活疫苗共接种 2 剂，两剂间隔 14-28 天或 21-28 天。我校学生接种疫苗工作将在校内进行。

4. 疫苗接种后有哪些不良反应？

接种疫苗后发生局部不良反应以接种部位疼痛为主，还包括局部瘙痒、肿胀、硬结和红晕等，全身不良反应以疲劳乏力为主，还包括发热、肌肉痛、头痛、咳嗽、腹泻、恶心、厌食和过敏等。以轻度反应为主，一般不需处理。

5. 哪些人不能接种疫苗呢？

- a. 对疫苗中任何成分过敏者；
- b. 既往发生过疫苗接种严重过敏反应（如急性过敏反应、血管神经性水肿、呼吸困难等）；
- c. 患急性疾病、严重慢性疾病、慢性疾病的急性发病期和发热者；
- d. 妊娠期及哺乳期妇女；
- e. 患未控制的癫痫和其他进行性神经系统疾病者，有格林巴利综合症病史者。

6. 接种后需要注意些什么呢？

- a 接种后应在接种单位的留观区域留观 30 分钟。
- b. 注射过免疫球蛋白者，应间隔 1 个月以上再接种本疫苗，以免影响免疫效果。